


## Jak działa pigułka gwałtu


1

Ok. 60 – 80 rodzajów środków jest stosowanych w celu wykorzystania seksualnego. Sprawca podrzuca je zwykle ofierze do napoju




2

Środek podrzucany jest w formie proszku, płynu lub rozkruszonej tabletki, dlatego nie jest wyczuwalny przez ofiarę




3

Zaczyna działać po 15 – 30 minutach po zażyciu. Wtedy już może pojawić się amnezja



4

Kwas gammahydroksymasłowy (GHB), jedna z wykorzystywanych w tym celu substancji, wpływa na przekazywanie impulsów między komórkami nerwowymi



5


Środek działa na ofiarę od kilku do nawet kilkunastu godzin, co skutkuje dwoma objawami:

**utrata przytomności**


**lukami w pamięci**

## Jakie badania pozwalają wykryć przestępstwo

**Krew** – badanie do 24 godzin po zaistniałym zdarzeniu (wyjątek GHB - pozostaje we krwi do ośmiu godzin)



**Mocz** – jest właściwym materiałem do ok. 100 godzin po przyjęciu substancji (wyjątek GHB – do 12 h)



**Włosy** – trzeba odczekać cztery tygodnie od zdarzenia. Dopiero po tym czasie włosy nadają się do badania

